monTestsanté

Résumé des résultats

Dientamoeba fragilis

Dientamoeba fragilis est un parasite intestinal unicellulaire que l'on trouve principalement dans le côlon. De nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme, ce qui signifie que la détection du parasite ne prouve pas automatiquement que Dientamoeba soit à l'origine de troubles intestinaux. Chez certaines personnes, ce parasite est associé à de la diarrhée, des douleurs abdominales, des ballonnements, des nausées et de la fatigue. Le mode de transmission exact n'est pas encore entièrement élucidé. Ce rapport vous explique comment interpréter le résultat du test au regard de vos symptômes et dans quels cas un traitement ou des examens complémentaires peuvent s'avérer utiles.



Blastocystis hominis

Blastocystis est un micro-organisme unicellulaire très fréquemment présent dans l'intestin à l'échelle mondiale. L'ancienne dénomination « Blastocystis hominis » est encore largement utilisée, mais en raison de la grande diversité génétique de l'espèce, on parle aujourd'hui généralement de « Blastocystis sp. ». De nombreux porteurs ne présentent aucun symptôme et le caractère pathogène de ce micro-organisme n'est pas évident dans tous les cas. La détection indique donc la présence de Blastocystis, mais ne prouve pas automatiquement que ce micro-organisme soit à l'origine de maux de ventre, de diarrhée ou de ballonnements. Dans ce rapport, vous découvrirez comment interpréter les résultats avec précision.



Ce document contient des informations personnelles de santé et doit être traité de manière confidentielle.

Giardia lamblia

Giardia lamblia, également appelée Giardia duodenalis, est un parasite intestinal pathogène pouvant provoquer la giardiase. Ce parasite se fixe sur la muqueuse de l'intestin grêle et peut entraîner une diarrhée aqueuse ou grasse, des flatulences, des crampes abdominales, des nausées, une déshydratation et une perte de poids. Les symptômes apparaissent souvent une à deux semaines après l'infection et peuvent, en l'absence de traitement, persister pendant plusieurs semaines ou réapparaître. Une détection nécessite une évaluation médicale ciblée. Ce rapport explique comment se produit la contamination et présente les mesures de rétablissement et d'hygiène importantes à respecter.



Cryptosporidium spp.

Le Cryptosporidium est un groupe de parasites intestinaux unicellulaires pouvant provoquer la cryptosporidiose. Cette infection se caractérise principalement par une diarrhée aqueuse et se transmet facilement par l'eau, les aliments, les mains, les surfaces et les animaux contaminés par des selles. Les symptômes apparaissent généralement deux à dix jours après la contamination, en moyenne au bout de sept jours environ. Chez les personnes dont le système immunitaire est sain, l'infection disparaît souvent en une à deux semaines, mais en cas d'immunodéficience sévère, le tableau clinique peut être plus grave et plus prolongé. Dans ce rapport, vous découvrirez ce que signifient vos résultats et quelles mesures permettent de limiter la propagation de la maladie.



Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica est une amibe pathogène pouvant provoquer l'amibiase. De nombreuses personnes infectées ne présentent initialement aucun symptôme, mais le parasite peut pénétrer dans la paroi intestinale et entraîner une inflammation, la présence de mucus ou de sang dans les selles. Dans des cas plus rares, l'infection se propage au foie et entraîne la formation d'un abcès hépatique. Une détection doit donc toujours faire l'objet d'une évaluation médicale, même si les symptômes sont légers. Ce rapport explique comment se produit la contamination, à quelle fréquence les symptômes apparaissent et dans quels cas une prise en charge rapide est nécessaire.



Ce document contient des informations personnelles de santé et doit être traité de manière confidentielle.